

# РЕАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРИМЕНЕНИИ ПРЯМЫХ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И РАКОМ

## Метаанализ

Фибрилляция предсердий (ФП) остается одной из ведущих причин сердечно-сосудистых заболеваний и связанной с ними смертности. Кроме того, рак и противоопухолевая терапия сопряжены с повышенным риском тромботических и геморрагических осложнений. В настоящем исследовании был проведен метаанализ данных реальной практики для того, чтобы оценить эффективность и безопасность прямых пероральных антикоагулянтов (ПОАК) и антагонистов витамина К (АВК) у пациентов с ФП и онкологическими заболеваниями (Li, X. et al., 2024).

### Основные выводы

- Применение ПОАК в сравнении с АВК ассоциировалось со снижением риска тромботических осложнений и кровотечений у пациентов с ФП и раком.
- Данные реальной клинической практики подтверждают применение ПОАК в качестве благоприятного варианта терапии в когорте онкологических пациентов.


### Дизайн исследования

Для проведения метаанализа двумя независимыми авторами были отобраны наблюдательные когортные исследования, в которых сравнивались эффективность и безопасность ПОАК (дабигатран, ривароксабан, эдоксабан, Эликвис® (МНН: апиксабан)) и АВК у пациентов с ФП и раком. Поиск проводился в базах данных PubMed и Embase по февраль 2024 года. Интересующими исходами эффективности были инсульт или системная эмболия, безопасности — большие, внутричерепные и желудочно-кишечные кровотечения.

### Результаты исследования


В общей сложности было отобрано 7 исследований с участием более 82 000 пациентов. По результатам метаанализа было продемонстрировано, что в сравнении с применением АВК, применение ПОАК ассоциировалось со значимым снижением риска инсульта или системной эмболии (относительный риск [ОР] 0.79, 95% доверительный интервал [ДИ] 0.64–0.97), больших кровотечений (ОР 0.84, 95% ДИ 0.71–0.99), внутричерепных кровотечений (ОР 0.61, 95% ДИ 0.54–0.69) и желудочно-кишечных кровотечений (ОР 0.87, 95% ДИ 0.80–0.95) у пациентов с ФП и сопутствующим раком (Рисунок 1).

Рисунок 1. Исходы эффективности и безопасности для ПОАК vs АВК у пациентов с ФП и раком



При сравнении отдельных ПОАК и АВК не продемонстрировано значимых различий в отношении рисков инсульта или системной эмболии. Однако Эликвис® продемонстрировал наибольшее снижение риска кровотечений среди всех ПОАК по сравнению с АВК (Рисунок 2).

**Рисунок 2. Исходы эффективности и безопасности для отдельных ПОАК vs АВК у пациентов с ФП и раком**



**Более подробно Вы можете ознакомиться с публикацией по ссылке**

Li, X., Li, R., Zhu, W. & Wu, D. Real-world evidence of direct oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation and cancer: A meta-analysis. IJC Heart & Vasculature 55, 101512 (2024).

[Инструкция по медицинскому применению препарата Эликвис®](#)

Регистрационные удостоверения: ЛП-002007, ЛП-001475.

PP-ELI-RUS-2925 10.12.2024



Copyright 2024 Пфайзер Россия. Все права защищены. Информация предназначена только для специалистов здравоохранения Российской Федерации.

ООО «Пфайзер Инновации»:  
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,  
БЦ «Башня на Набережной» (блок С).  
Тел.: +7 495 287 50 00. Факс: +7 495 287 53 00.

Служба медицинской информации:  
Medinfo.Russia@Pfizer.com  
Доступ к информации о рецептурных препаратах  
Pfizer в России: www.pfizermedinfo.ru