

ПОЗИЦИИ ЭКСПЕРТОВ АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ ПО ОТМЕНЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ.

10 практических советов.

Laura E. Targownik, Deborah A. Fisher, Sameer D.Saini

Практический совет 1

Всем пациентам, принимающим ингибиторы протонной помпы (ИПП), следует регулярно проверять показания к применению и их документировать. Ответственность за этот обзор должен нести лечащий врач пациента.

Практический совет 2

У всех пациентов без четких показаний для длительного приема ИПП следует рассмотреть вопрос отмены.

Практический совет 3

Большинству пациентов с показаниями к длительному использованию ИПП, которые принимают препараты два раза в день, следует рассмотреть вопрос о переходе ИПП на прием один раз в день.

Практический совет 4

Пациенты с осложненной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, например, с тяжелым эрозивным эзофагитом, язвой пищевода или пептической стриктурой в анамнезе, как правило, не должны рассматриваться в качестве кандидатов для отмены ИПП.

Практические советы 5

Пациентам с пищеводом Барретта, эозинофильным эзофагитом или идиопатическим легочным фиброзом, как правило, не следует рассматривать вопрос отмены назначения препарата.

Практический совет 6

Лицам, получающим ИПП следует проводить оценку на предмет риска кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта с использованием доказательной стратегии перед отменой назначения.

Практический совет 7

Пациентам с высоким риском кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта не следует отменять ИПП.

Практический совет 8

Пациентов, прекративших длительную терапию ИПП, следует предупредить, что у них могут развиваться транзиторные симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта из-за рикошетной гиперсекреции кислоты.

Практический совет 9

При отмене ИПП можно рассмотреть либо снижение дозы, либо полное прекращение приема.

Практические рекомендации 10

Решение о прекращении приема ИПП должно основываться исключительно на отсутствии показаний к применению ИПП, а не из-за беспокойства по поводу побочных эффектов. Появление побочных эффектов или их наличие в анамнезе у пользователя ИПП не является независимым показанием для отмены ИПП. Точно так же наличие основных факторов риска развития нежелательных явлений, связанных с применением ИПП, также не должно быть независимым показанием для отмены ИПП.